Reihe von Arten theils aus Syrmien theils aber allgemein aus Slavonien, welche letzteren um so weniger sicher sind, als sie einerseits z. Theil im Verzeichniss selbst mit (?) versehen sind, anderseits ohne jede genauere Fundortangabe, sondern meist ganz allgemein aus „Kroatien und Slavonien“ angegeben werden. In Betreff meines Zweifels an der Zuverlässigkeit dieser Angaben bemerke ich noch, dass auch Brusina in seinem Verzeichniss Arten, die nur durch Bielz aus Kroatien angegeben sind, in die Reihe der dubiosen setzt, wie überhaupt das Bielz'sche Verzeichniss für die geographische Verbreitung der Arten nicht immer massgebend zu sein scheint. Die betreffenden Angaben sind:

a) aus Syrmien — Hyalina hiulca Jan, Helix leucozona Z. Karlowitz, striata Müll.

b) aus Slavonien — Arion hortensis, Limax agrestis, Succinea Pfeifferi, oblonga, Vitrina pellucida, diaphana, Hyalina nitens Mich., vitrea Bielz (hyalina Fér.), lucida Drap., Helix pygmaea, rotundata? personata, aculeata, pulchella, strigella, hispida ?, incarnata, carthusiana Müll., obvia Hart., pomatia, Bulim. montanus, obscurus, detritus.

Ich fand folgende Arten: Limax agrestis, Limax tenellus Nilss., Vitrina pellucida, Hyalina crystallina, nitens Mich., Helix fruticum (weiss), pulchella, austriaca, pomatia, Pupa frumentum, eine schöne grosse Form, Cionella lubrica, sämmtlich in den oben erwähnten Anlagen und am Graben der Festung. In der Save: Paludina fasciata, bräunlich gefärbt, Limnaea minuta und Planorbis corneus.

Brusina's Fauna von Kroatien.

Von O. von Möllendorf.

(Schluss.)

†24. C. rugulosa Zgl. „Croatia“ Villa, synonym mit Cl. latestriata Bielz, welche in Mähren, Galizien, Siebenbürgen und im Banat vorkommt.

†25. C. semirugata Zgl. „Croatia“ Villa. Dalmatische Art.

26. C. simplex Z. In Kroatien nach Sandri; sie gehört der Fauna von Steyermark an.

†27. C. stigmatica Zgl. „Croatia“ Villa. Lebt in Süddalmatien.

28. C. variata Z. „Croatia“ Parr. l. c. p. 3.

29. Helix agreabilis Stentz „Croatia“ Villa; synonym mit H. pyramidata, welche man sehe.

30. H. alba Zgl. „Croatia“ Villa, p. 13, Sandri.

31. H. annexa Zgl. „ . . . . . aus Kroatien mit flacherem Gewinde und schmälerem letztem Umgange; . . .“ Rssm. Iconogr. Heft I. p. 63. No. 10.

32. H. arbustorum L. Im Bielz'schen Verz. aus Kroatien angegeben; auch erhielt der Verfasser 2 leere Gehäuse aus der Gegend von Agram. Sabljar, Erjavec und Brusina suchten sie vergeblich.

†33. H. Cobresiana Alten „Kroatien“? (E. A. Bielz).

34. H. compressula Sandri „Croatia“ Sandri.

35. H. depressa Sandri non Adams, Mühlf., Fér., Gratel. — Karlobago (Sandri).

†36. H. holosericea Stud. Agram (Sabljar).

37. H. intermedia Fér. „Croatia“ (Pfr. Mon. Hel. V. p. 363. n. 2388) — Krain und Lombardei!

38. „H. onychina Rssm. wurde in einzelnen Exemplaren auf dem Trsat bei Fiume gefunden“ (Hauffen, Syst. Verz. etc. p. 25) H. onychina Rssm. — H. Syriaca Ehrenberg aus Syrien, Aegypten, Algier, Sicilien.

†39. H. pyramidata Drap. „Croatia“ Villa, Sandri. Diese und H. trochoides Poir. könnten wohl im Litorale vorkommen, doch wurden sie bisher nicht beobachtet.

†40. H. remissa Parr. „Croatia“ Villa, synonym H. trochoides Poir.: siehe H. pyramidata.

41. H. revelata Mich. „Croatia“ Villa, Sandri. Eine H. revelata Mich. ist gänzlich unbekannt, H. revelata Fér. ist eine französische Art (Guernsey, Jersey).

†42. H. rotundata Drap. „Kroatien“ Cat. Bielz.

43. H. rugosa Stentz non Chemn., Mühlf., Ziegl., Anton, Aradas. „Croatia“, Villa, Sandri.

†44. H. rugosiuscula Mich. „Kroatien“ (Bielz).

45. H. Sanderi Stentz „Croatia“ Villa, Stentz.

†46. H. turritella Parr. „Croatia“ Villa. Synonym H. trochoides Poir. Siehe pyramidata.

47. H. varians Stentz non Mke. „Croatia“ Villa.

48. H. vitrinosa Zgl. „aus Kroatien“ Rssm. (Iconogr. Heft I.

p. 62 n. 9) sagt, sie nähere sich der H. strigella; Pfeiffer (Mon. Hel. V, VI, p. 482 n. 1108) stellt sie als zweifelhaftes Synonym zu derselben.

49. Limnaeus dilatatus Zgl. „Croatia" Villa, Sandri.

50. Neritina Croatica Parr. „Croatia" Sandri.

51. N. morio Spitzy „Croatia" Sandri.

†52. N. Parreyssi Sandri „Croatia" Schröckinger l. c. p. 309. — N. Parreyssi Villa ist aus Südfrankreich.

53. Paludina flavescens Zgl. non Stentz, non Mühlf. „Croatia" Villa, Sandri.

†54. P. Germari Stentz (P. incrustata Stentz) „Croatia" Villa, Sandri. P. incrustata Stentz sind mit kalkigem Ueberzug versehene Formen verschiedener dalmatischer Arten: Amnicola luteola, conovula, curta: Amnicola Germari lebt in Dalmatien.

†55. Pisidium obtusale C. Pfr. l. Podsused (Sabljar).

†56. Planorbis spirorbis Müll. Agram, Makesmir (Sabljar).

†57. P. tetragyrus Z. „Croatia" Schröckinger l. c. p. 318.

†58. Pomatias patulus Drap. Fiume (Grube) Povile (Sabljar). Brusina hält diese Angaben sicher für Verwechslungen mit andern Arten.

59. Unio Graffi Stentz „Croatia" Villa, l. c. p. 41, Sandri.

60. Valvata impura Stentz „Croatia" Villa, Sandri.

†61. V. obtusa Drap. Sava (Sabljar).

Gesellschaftsangelegenheiten.

Freiwillige Beiträge für die Rossmässler'sche Sammlung.

Fortsetzung.

a) Einmalige.

		Thlr.	
	Uebertrag	Thlr. 429.	8½.
Herr Schacko		„ 2.	10.
„ Ed. von Martens (2r.)		„ 5.	—
„ Strebel		„ 3.	—
„ Dohrn (Conchylien im Werth von)		„ 20.	—
„ A. Partz		„ 1.	10.
	Uebertrag	Thlr. 460.	28½.

Fortsetzung in nächster Nummer.

Fernere Beiträge sind zu senden an Herrn Dr. W. Kobelt in Schwanheim a. M.

Eingegangene Jahresbeiträge.

Pro 1870. Von den Herrn Reibisch, Wiechmann, Ickrath.

Pro 1871. Von den Herrn Reibisch, Krätzer, Schacko, Gmelch, von Martens, Nowicki, Witte, Strebel, Wiechmann, Jenisch, Partz, Westerlund, Pagenstecher, Speyer, Koch, Wolff, v. d. Broeck, Schwab.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.
Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.